

NOTICE

BETASONE

Bétaméthasone

COMPOSITION

Bétaméthasone.....500 mg

Excipients.....q.s.p.100 ml

Excipients à effet notoire : propylène glycol, saccharose et sorbitol.

1 ml= 40 gouttes= 0,5 mg de bétaméthasone.

INDICATIONS

Ce sont celles de la corticothérapie chez l'enfant.

BETASONE Gouttes peut être également utilisé chez l'adulte, notamment lorsqu'il s'agit de baisser progressivement les doses de la corticothérapie.

Le médecin traitant est seul juge de la prescription et des modalités d'administration.

CONTRE-INDICATIONS

Ce sont celles de la corticothérapie, notamment l'herpès fébrile de la cornée, l'ulcère gastrique ou duodénal en évolution, le diabète et l'hypertension artérielle.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS

BETASONE Gouttes n'est pas destiné à l'usage ophtalmologique.

Sportifs : Attention! Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.

En raison de la présence du sorbitol et du saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase.

Ce médicament contient du propylène glycol et peut provoquer des symptômes semblables à ceux provoqués par l'alcool.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La posologie journalière et la durée de traitement varient selon les indications et le poids du patient.

Se conformer à la prescription médicale.

Verser les gouttes de BETASONE dans un peu d'eau. L'ingestion de la solution se fait de préférence après les repas.

FORME ET PRESENTATION

Gouttes buvables, Flacon de 30 ml avec une pipette compte-gouttes graduée.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Après ouverture, ce médicament peut être conservé pendant 8 semaines maximum.

Liste I

AMM : n° E-2008-064

LABORATOIRES OLEA

25 BP 276 ABIDJAN 25